



ETAPA 15

Vva. de Algaidas - Cuevas Bajas

LOCALIZACIÓN

Comienza la etapa en el norte de Villanueva de Algaidas, siendo esta la dirección predominante de todo el recorrido. Son **10,1 km** por terrenos de olivar hasta que se alcanza la localidad de Cuevas Bajas.



Vista de los sotos del Genil. FOTO: JSM

DESCRIPCIÓN

SOBRE LA AVIFAUNA:

De nuevo es el olivar el medio predominante por el que transcurre la etapa. Muy al principio se cruza el arroyo del Bebedero (o río Burriana), antes de llegar a La Atalaya, y será al final de la etapa cuando de nuevo nos topemos con el mismo río, ya en Cuevas Bajas.

ESPECIES SINGULARES

En este caso la predominancia del cultivo de olivar hace que esta etapa sea menos diversa que la anterior.


Aun así, la diversidad de especies puede sorprender al observador que la realice prismáticos en mano. Las encinas de gran porte que aparecen salpicadas en el mar de olivos atraen a especies como el ratonero común, rapaz que puede verse en el recorrido. Otras aves presentes a lo largo de la etapa son la perdiz roja, tórtola común, chotacabras pardo, abubilla, cogujada común, zorzal común, petirrojo, mirlo común, curruca cabecinegra, curruca capirotada, mosquitero común, carbonero común, rabilargo, estorninos negro y pinto, jilguero, verderón, pardillo y verdecillo. En el tramo final aparecerán abejarucos, en la

¿SABÍAS QUÉ...

En **Cuevas Bajas**, el Genil se abre en una extensa llanura que configura un amplio soto fluvial, donde encontramos un denso bosque de ribera, el Lago de los Fernández y el Molino de la Agusadera, uno de los mejores conservados de la provincia. La elevada diversidad avifaunística ha motivado la instalación de un observatorio junto al molino. TEXTO: JSM



Gorriones morunos. FOTO: JLM



Zorzal común. FOTO: JLM

época del año que están entre nosotros y vinculados a los cortados arenosos del borde del río, ruiseñor común, tarabilla común, alcaudón común, grajilla y, de nuevo, las especies propias de los núcleos urbanos (tórtola turca, vencejos, avión común y gorrión común).

FENOLOGÍA

En este caso se recomienda el invierno como momento más apropiado para realizar la etapa en busca de aves. Muy cerca de Cuevas Bajas, en el río Genil, también es un buen momento la primavera, donde pueden observarse especies propias de ambientes riparios.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Agua arribas de Cuevas Bajas, a las orillas del río, hay un observatorio



Joven de mirlo común. FOTO: JLM



de aves en un entorno dominado por un bosque de galería y una pared de arcillas. Aquí podremos observar especies como el martín pescador, abejaruco, abubilla, avión zapador, carricero

común, zarcero bereber, pájaro moscón, rabilargo, y especies acuáticas como el cormorán grande, ánade real, gallineta común, garceta común, martinete y andarríos chico. ●

Zarcero pálido. FOTO: JLM



Tórtolas comunes. FOTO: JLM



Aviones zapadores. FOTO: JLM

