


Láminas comparativas



Géneros *Lestes* y *Chalcolestes* (Familia *Lestidae*).

Lestes barbarus





- Lateral del tórax sin marca en forma de espina.
- Pterostigma bicolor
- Apéndices anales inferiores del macho curvados hacia afuera.
- Funda de la genitalia femenina redondeada.

Lestes virens



- Lateral del tórax sin marca en forma de espina.
- Pterostigma bicolor
- Apéndices anales inferiores del macho curvados hacia adentro.
- Funda de la genitalia femenina puntiaguda.

Chalcolestes viridis




- Lateral del tórax con marca en forma de espina.
- Pterostigma unicolor
- Apéndices anales inferiores del macho negros y muy cortos.
- 12-14 dientes grandes en el borde inferior de la genitalia femenina.


Texto, dibujos y fotografías: José Manuel Moreno-Benítez, Javier Ripoll & Gonzalo Astete Martín (tórax *L. barbarus*).

**Familia *Coenagrionidae*, machos de especies similares.***Enallagma cyathigerum*


Marca en S2:
forma de seta, a
veces incompleta.

*Coenagrion mercuriale*


Marca en S2:
forma de sombrero
con cuernos (casco
de Mercurio).

*Coenagrion scitulum*


Marca en S2:
forma de cabeza de gato
o tenedor abierto.

*Coenagrion caerulescens*

Marca en S2:
forma de cabeza de gato,
con orejas largas y mejillas
abultadas.

*Erythromma lindenii*

Marcas en S1-S2:
forma de copas.



Texto, dibujos y fotografías: José Manuel Moreno-Benítez, Javier Ripoll & Teodoro Martínez (foto *C. mercuriale*).



Machos de los géneros *Gomphus* y *Onychogomphus*.

G. graslinii



Sutura interpleural negra y corta, normalmente sin sobrepasar el metastigma.



S8 y S9 menos ensanchados que en *G. similimus*. Apéndices anales cortos y "bifurcados".

G. similimus



Sutura interpleural negra sobrepasando netamente el metastigma.



S8 y S9 más ensanchados que en *G. graslinii*. Apéndices anales más cortos y sin "bifurcar".

G. pulchellus



Sutura interpleural negra y ondulada, cruzando todo el tórax.



S8 y S9 con ensanchamiento apenas perceptible. Apéndices anales cortos y "bifurcados".

O. uncatus



Dos bandas negras cruzando el tórax y unidas entre sí.



Apéndices anales largos y con forma de ganchos.

O. forcipatus



Banda superior cortada en el centro y con forma de mazas.



Apéndices anales largos y con forma de ganchos.

Texto, dibujos y fotografías: José Manuel Moreno-Benítez, Javier Ripoll, José Manuel Gaona Ríos (fotos *G. graslinii* y *G. pulchellus*) & José María Canea Guerra (foto *G. similimus*).

**Machos del género *Orthetrum* (familia *Libellulidae*).***O. cancellatum*

- Últimos segmentos abdominales negros.
- Pterostigmas negros y pequeños.

O. brunneum

- Cara blanquecina. • Abdomen más aplanado. • Pterostigmas pequeños y marrones o amarillentos.


O. chrysostigma

- Abdomen ligeramente aplanado.
- S1 y S2 abultados.
- Pterostigmas amarillentos.

Texto y fotografías: José Manuel Moreno-Benítez,
Javier Ripoll y Paul Winter (foto *O. nitidinerve*).

O. coerulescens

- Cara oscura.
- Abdomen aplanado.
- Pterostigmas grandes y amarillentos.

O. nitidinerve

- Vena radial amarilla. • Pterostigmas grandes, dorados o amarillentos.
- Abdomen ligeramente aplanado.

O. trinacia

- Abdomen fino y cilíndrico, negro o azulado, con vestigios de manchas amarillentas. • S2 y S3 ostensiblemente gruesos. • Pterostigmas grandes y palidos.



Machos del género *Sympetrum* (familia *Libellulidae*).

S. fonscolombii



- Ojos rojo por encima y gris azulado debajo.
- Tórax rojo con suturas negras y banda blanquecina.
- Abdomen rojo, con marcas negras en laterales y dorso de S8 y S9.
- Pequeña mancha azafranada en la base del ala trasera.
- Pterostigma amarillo.

S. striolatum



- Ojos rojizos por encima y pálidos o verdosos por debajo.
- Tórax marrón en el dorso, con dos bandas amarillas en los costados separada por una roja o amarronada.
- Abdomen rojo, con el costado de S1, S2 y S3 pálido y sin marcas.
- Pterostigma rojo oscuro.

S. meridionale



- Ojos marrones, más oscuros en la parte superior.
- Tórax marrón-amarillento, con suturas negras.
- Abdomen rojo por encima y pálido por debajo.
- Costado de S1, S2 y S3 pálidos, ocasionalmente con una pequeña marca negra en S3.
- Pterostigma rojizo.

S. sinaiticum



- Ojos castaños o marrones, con la parte inferior gris azulada.
- Tórax marrón, con los costados más claros y suturas negras.
- Abdomen rojo, con el costado de S2 y S3 pálidos y surcado por una banda negra.
- Pterostigma rojo.

Texto y fotografías: José Manuel Moreno-Benítez,
y Javier Ripoll.