MELONCILLO

Herpestes ichneumon



Fotografía: Alfonso Roldán Losada

FENOLOGÍA

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Celo	Celo	Partos	Partos	Partos					

IDENTIFICACIÓN

Carnívoro de mediano tamaño (longitud cabeza-cuerpo 46 a 54 cm), cuerpo alargado y cola larga (36 a 45 cm). Cabeza terminada en punta, con el hocico negro. Orejas redondas y pequeñas. Ojos con pupilas verticales, lo que le confiere cierto aspecto inquietante. Pelaje marrón oscuro en general, de pelo recio, alternando tonos crema claros con el pardo castaño que le dan un aspecto escamoso. Cola con la punta negra. Patas cortas con uñas no retráctiles. Machos de mayor tamaño que las hembras.

diputación de málaga · Birding Málaga · Gran Senda de Málaga · málaga viva

DÓNDE VIVE

Especie que utiliza zonas de matorral mediterráneo con gran cobertura vegetal. Prefiere arroyos con zarzales, junqueras y adelfares espesos. Evita las zonas abiertas y los mosaicos de matorral con presencia de depredadores de mayor tamaño. En zonas con cultivos utiliza siempre las zonas de ribera, donde puede regular mejor su temperatura corporal durante los meses estivales. Evita zonas abiertas o densamente arboladas, así como cultivos arbóreos. No suele superar los 1.000 msnm.

CÓMO VIVE

Es uno de los pocos carnívoros diurnos. Su periodo de actividad normal coincide con el periodo entre la salida y la puesta del sol. Suele estar activo toda la mañana y al atardecer se retira a descansar. La mayor parte del tiempo la pasa buscando alimento. Generalista en cuanto a su dieta, consume el alimento que esté disponible en cada momento. Su espectro alimentario incluye la captura de conejos jóvenes, roedores, insectos y pequeñas aves o el consumo de setas, frutos y carroña. No obstante, una de sus presas estrella son los reptiles, especialmente las culebras. Es un animal que vive en grupos familiares (grupos de 5 a 6 meloncillos), pero que también vive en solitario o en parejas. Territorios de hasta 3 km^2.

CÓMO SE REPRODUCE

Los meloncillos pueden reproducirse en cualquier época del año, aunque en la mayoría de los casos el periodo de celo (primavera) y la época de partos están muy marcados (principios de verano). Los partos se pueden alargar hasta septiembre y suele ser de entre 2 y 4 cachorros. Suele utilizar antiguas tejoneras o madrigueras de conejo como madrigueras de cría y descanso. Las crías permanecen con la madre durante un año. Durante ese tiempo, cuando salen de campeo, van todas andando en fila india detrás de la madre, creando la impresión de un gran animal que se mueve sigiloso entre el matorral.

DÓNDE SE VE EN MÁLAGA

Especie presente en casi toda la provincia, con la excepción probable de la zona nororiental. Es frecuente, abundante y fácil de ver. En la Gran Senda se puede observar prácticamente en todas las etapas, siendo menos probable entre las etapas 3 a la 16.

CURIOSIDADES

El meloncillo es la única especie de mangosta presente en Europa. Siempre se pensó que era una especie africana introducida por los árabes durante la conquista de la península. Estudios recientes han demostrado existe un alto grado de diferencia genética con sus parientes africanos, lo que lleva a pensar que su entrada en la península es anterior a la llegada de los árabes, y que debió cruzar el Estrecho por sí solo a finales del Pleistoceno. Actualmente es una especie en expansión asociada al proceso de matorralización y abandono de la vida rural que también ha favorecido al jabalí. Las mangostas disponen de mecanismos anatómicos y defensas genéticas que les permiten contrarrestar el veneno de las serpientes, lo que les permite ser eficientes matadores de culebras. El meloncillo no es una excepción.

ESPECIES SIMILARES

Especie inconfundible.