Blanquiverdosa meridional

Euchloe crameri (Butler, 1869)

DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 3,4 a 4,8 cm. **Alas abiertas:** blanca, con el ápice del ala delantera negro y manchas blancas, y una mancha alargada negra a mitad del ala. **Alas cerradas:** la trasera con un ángulo evidente en el borde superior del ala; escamado amarillo y negro, lo que le da un aspecto verde; manchas blancas bien definidas, redondeadas y muy patentes.

CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN



ESPECIES PARECIDAS

Musgosa: con las alas cerradas, los bordes de las manchas son muy irregulares; con las alas abiertas, la hembra no tiene manchas blancas en el interior del ápice negro del ala delantera y además la mancha negra a mitad del ala es redondeada. **Blanquiverdosa curva:** aspecto más amarillento y sin ángulo en el ala trasera estando abierta, además de manchas blancas más pequeñas y menos notorias. **Blanca verdirrayada:** cerrada, manchas blancas alargadas; abierta la mancha a mitad del ala con una línea blanca en el centro. **Blanquiverdosa:** abierta, con manchas blancas angulosas; cerrada más grande y redondeada la mancha del centro del ala delantera y manchas negras en el ala trasera.

Musgosa

Blanquiverdosa curva

Blanca verdirrayada

Blanquiverdosa

BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Tiene dos generaciones solapadas, en invierno y primavera. Vive en todo tipo de ambientes abiertos, desde claros de bosque y matorral en zonas montañosas hasta entornos degradados y rurales, como cunetas de carreteras, eriales, huertos y cultivos. Las orugas se alimentan de crucíferas, como anteojos (*Biscutella auriculata*), jaramago amarillo (*Doplotaxis virgata*) y amargo blanco (*Crambe filiforme*).

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic

DISTRIBUCIÓN

Presente en todas las etapas de la GSM, si bien en las litorales y en las del norte provincial, es más escasa y localizada, restringida a entornos con vegetación silvestre.