



# Blanca de majuelo

*Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758)

## DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 5 a 7,7 cm. **Alas abiertas:** blanco con venación negra muy marcada. **Alas cerradas:** blanco o amarillento pálido, variable entre individuos, con escamas negras dispersas y la venación negra muy destacada.

## CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN





### ESPECIES PARECIDAS

Por su coloración, venación y ausencia de dibujos, no hay posible confusión con otras especies.

### BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Tiene una generación anual, que vuela principalmente en mayo y junio.

Habita ambientes forestales bien conservados y con abundante matorral, a partir de 300 m de altitud, donde se encuentren los arbustos majuelo (*Crataegus monogyna*) y endrino (*Prunus spinosa*) y el árbol piruétano (*Pyrus bourgaeana*), plantas nutricias de sus orugas.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### DISTRIBUCIÓN

Por lo general es escasa en Málaga, con poblaciones muy localizadas. En la GSM se encuentra en las etapas de la serranía de Ronda, el arco calizo central y lugares puntuales del norte provincial donde está muy localizada y es más escasa, en los relictos encinares que tienen majuelos entre su sotobosque. No se descarta que aparezcan poblaciones en los recorridos que transitan por las sierras de Tejada y Almirante.

