



Blanca catalana

Pieris manni (Mayer, 1851)

DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 3,5 a 4,6 cm. **Alas abiertas:** blanca con uno o dos puntos en el ala delantera, con el ápice negro, en forma acodada en el inicio y arqueada en el borde trasero, por el que baja ligeramente. **Alas cerradas:** ápice del ala delantera igual que en el interior, aunque de color amarillo pálido. Ala trasera igualmente amarilla pálida con escamas negras dispersas.

CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN



Ápice negro, acodado en el inicio y arqueado en el borde trasero, bajando ligeramente por éste

Fondo blanco con uno o dos puntos negros

Ápice amarillo pálido, con forma similar al interior del ala



Amarillo pálido

ESPECIES PARECIDAS

Blanca de la col: es más grande; el ápice de las alas delanteras es arqueado y le baja mucho por el borde posterior. **Blanquita de la col:** ápice gris, con forma arqueada en el macho y abombada en la hembra, sin bajarle por el borde posterior. **Blanca verdinerviada:** tanto abierta como cerrada, la venación está contorneada de escamas oscuras, dándole un aspecto muy característico. Además, de alas abiertas la mancha del ápice es abombada y de las manchas del ala, salen igualmente escamas contorneando la venación, hasta el borde posterior.



BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Vuela a lo largo de la primavera y el verano, con varias generaciones.

Vive en ambientes montañosos, principalmente bosques y de matorral, a menudo cerca de ríos, arroyos y cañadas. Las orugas se alimentan principalmente de crucíferas del género *Iberis*.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	díc
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUCIÓN

Mariposa muy escasa y localizada en Málaga, solo conocida de las sierras Tejeda y Almijara. Por ello, en la GSM puede verse en las etapas que transcurren por estos entornos, siempre de manera puntual.

