Niña celeste

Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)

DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 2,5 a 3,2 cm. **Alas cerradas:** macho grisáceo o amarronado, hembra marrón. Fimbrias ajedrezadas. Punto en la celda del ala delantera; en la trasera, puntos grandes, con dos unidos y desplazados hacia el exterior, dandole a la serie un aspecto de "?". Manchas naranjas redondeadas, finamente bordeadas de negro. **Alas abiertas:** dificil de ver así. Ambos sexos con fimbrias ajedrezadas; macho celeste brillante, mientras que la hembra es marrón con mancha anaranjadas en el borde externo de ambas alas.

CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN

ESPECIES PARECIDAS

Ícaro moro: puntos más pequeños; sin fimbrias ajedrezadas. **Niña de nácar:** color marrón muy claro o blanquecino; sin punto en la celda; puntos más pequeños, manchas naranjas puntiagudas; sin fimbrias ajedrezadas. **Celda limpia:** sin punto en la celda; puntos más pequeños; manchas naranjas puntiagudas; sin fimbrias ajedrezadas. **Fabiola:** sin punto en la celda; fimbrias no ajedrezadas. **Niña andaluza**: puntos del ala trasera mucho más pequeños; manchas naranjas muy reducidas o ausentes.

BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Tiene varias generaciones anuales, volando prácticamente todo el año, principalmente desde marzo a agosto. Habita preferentemente entornos forestales y de matorral bien conservados, donde suele estar en praderas y herbazales, a menudo en zonas poco agrestes, hasta 1300 m de altitud. En estos entornos encuentran las orugas sus plantas nutricias, leguminosas de los géneros *Coronilla, Anthyllis* e *Hippocrepis*.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic

DISTRIBUCIÓN

Bien representada en la GSM, siempre de manera escasa y muy puntual. Falta de las etapas costeras y de la más transformadas del norte provincial, aunque podría quedar alguna población relicta en lugares con vegetación autóctona.