



Lobito anillado

Hyponphele lupinus (Costa, 1836)

DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 3,6 a 4,2 cm. **Alas cerradas:** el ala trasera es gris uniforme y muy jaspeada, sin línea media ondulada ni serie de puntos; el ala delantera naranja, con bordes de color similar a la otra ala y ocelo relativamente pequeño. **Alas abiertas:** muy raramente muestra el interior. Macho marrón, con dos ocelos pequeños en el ala delantera y la androconia muy destacada. Hembra con los ocelos más grandes y un anillo anaranjado ancho alrededor de cada uno.

CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN




Foto: Rafael Obregón Romero



ESPECIES PARECIDAS

Loba: algo más grande, de aspecto menos gris y apenas jaspeada; con línea ondulada y serie de puntos negros a lo largo del borde externo del ala trasera. **Lobito:** ocelo más grande, línea media ondulada y diferentes tonalidades en el ala, principalmente anaranjado en el borde trasera y con un pequeño punto no siempre visible en torno al ángulo anal.



Loba



Lobito

BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Vuela durante finales de junio y julio, en ambientes serranos, entre 1150 y 1800 m de altitud. Prefiere herbazales soleados y secos, a menudo en lugares pedregosos, con matorral disperso. Las orugas se alimentan de gramíneas de los géneros *Stipa* y *Aegilops*, entre otras.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUCIÓN

Una de las mariposas más escasas y localizadas de Málaga. No se la conoce en la GSM, pero podría estar en las zonas más altas de las etapas 11 y 23. Cualquier observación de la especie es de gran interés por lo que se ruega informar de cualquier posible cita al autor del presente trabajo.

