




Aeshna mixta



Longueur : 56-64 mm. Envergure de l'aile postérieure : 37-42 mm.

Mâle : 1. Yeux bleuâtres. 2. Thorax marron avec de très petites bandes antéhumérales jaunes. 3. Grandes bandes jaunes sur les flancs. 4. Sur la partie supérieure de S2, marque jaune en forme de coupe de champagne. 5. Abdomen avec des taches bleues bien voyantes, qui contrastent avec le noir de l'ensemble, et d'autres plus petites de couleur jaunâtre. 6. Longs appendices anaux. **Femelle :** similaire au mâle mais en général son aspect est plus marron jaunâtre, surtout l'abdomen, et présence de l'ovipositeur (7).





SON HABITAT

Elle vit dans des eaux stagnantes, comme les lagunes, les lacs de barrage et les bassins d'irrigation des exploitations agricoles ou des golfs, lorsqu'ils sont naturalisés et abritent sur leurs berges des roseaux ou des massettes. Lors de sa période de dispersion elle peut s'éloigner de l'eau, parfois à de nombreux kilomètres, dans les forêts ou les montagnes.

SON MODE DE VIE

La plupart des adultes, après leur émergence, se dispersent loin de leurs lieux de naissance durant plusieurs mois, puis y reviennent pour se reproduire une fois leur maturation terminée. De grandes concentrations de centaines d'individus peuvent se produire à des endroits déterminés. Ils ont alors un comportement nerveux et sont très actifs, en particulier en début de matinée et en fin de journée, volant haut, parfois plusieurs mètres au-dessus de la canopée. Quoi qu'il en soit, c'est une espèce difficile à localiser posée. Lorsqu'elle le fait, c'est en général en hauteur, accrochée à la verticale avec les quatre ailes parfaitement étendues, en forme de croix. Elle peut cohabiter avec d'autres æschnidés.

QUAND LA VOIR

L'émergence a lieu principalement en juin, et le retour sur les lieux de reproduction se fait entre septembre et novembre. Des individus peuvent être observés jusqu'en décembre.

jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil	aoû	sep	oct	nov	déc
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

OÙ LA VOIR DANS LA PROVINCE DE MÁLAGA

En raison de sa tendance à la dispersion, elle peut se trouver partout dans la province, même si peu de sites de reproduction sont connus. Sur le Grand Sentier de Malaga des individus en dispersion ont été observés sur les étapes 5, 6, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 33 et 35.

LIBELLULES SIMILAIRES

Principalement *Aeshna cyanea*.

STATUT DE PROTECTION

Elle n'est pas menacée et ne fait l'objet d'aucune protection particulière dans la législation environnementale en vigueur.