



Elanio común o azul

Elanus caeruleus

Black-shouldered kite



Elanio adulto (JAC)

Identificación

Rapaz pequeña (30 a 37 cm de longitud y 200 a 340 g de peso), con un aspecto general gris claro o blanco y con los hombros negros que destacan del resto del plumaje. La cabeza es grande con respecto al cuerpo, con los ojos bordeados de negro y dispuestos de manera más frontal que en la mayoría de rapaces diurnas. Las patas son amarillas, cortas, muy fuertes y bien armadas. La cola es corta de color blanco, excepto las plumas centrales, que son de color gris ceniza. Las alas son anchas, pero apuntadas (envergadura de 71 a 92 cm). Los machos y las hembras son iguales en plumaje, con diferencias de tamaño inapreciables en las observaciones de campo. Es una especie de hábitos mayoritariamente crepusculares que utiliza el vuelo cernido como principal técnica de caza.

Los elanios presentan similitudes morfológicas con los búhos, lo que puede ser el resultado de una convergencia evolutiva: plumas de vuelo con estructura aterciopelada (adaptación para el vuelo silencioso), ojos grandes y frontales, largas cerdas en torno al pico y tarsos gruesos y cortos. Comparten la misma disposición de dedos de los búhos, estando su dedo exterior orientado hacia atrás (zigodáctilos). Sus egagrópilas también se parecen: son compactas y de forma cilíndrica.

Los adultos tienen gris el dorso, el obispillo, las plumas que cubren la parte superior de la cola y la parte superior de las alas, destacando los hombros negros. La nuca y la parte superior de la cabeza están



Elanio joven (Adobe Stock)

teñidas de un gris muy pálido. Cuando se observa en vuelo, el aspecto de la parte inferior es blanco en general, con el extremo de las alas gris oscuro casi negro. Sus ojos son de color rojo intenso.

Los juveniles son similares a los adultos pero con bordes blancos en el extremo de las plumas del dorso y las alas. La parte superior de la cabeza está rayada de gris oscuro con tintes castaños, que también presentan en el pecho y el dorso. El extremo de las plumas de su cola también tiene un borde fino blanco y un sombreado gris. Los ojos son de un color entre ámbar y anaranjado. El plumaje definitivo lo alcanzan al año de vida, aunque ya en el quinto mes, con el progreso de la muda, van perdiendo parte del diseño juvenil. En algunas ocasiones se reproducen a partir de los 6 meses de vida y, de forma general, con un año de edad.

Biología

Es una especie ligada fundamentalmente a hábitats abiertos o semiabiertos, como las dehesas y estepas cerealistas con arbolado disperso que alternan con pastizales o monte bajo y con otros cultivos, prefiriendo terrenos con relieve suave y llano. También está presente en áreas con mezcla de cultivos a modo de mosaico, contando entre ellos parcelas con cultivos de cereales o extensiones de cultivos herbáceos en regadío.

Las áreas de invernada suelen coincidir en gran parte con las de nidificación, pero escoge preferentemente zonas con cultivos de regadío, vegas fluviales y el entorno de humedales.

Es una especie sedentaria, pero con carácter errante y dispersivo, pudiendo desplazarse grandes distancias en busca de zonas con buenas condiciones para reproducirse. Se dan con frecuencia relevos con



Elanio común

individuos de otras poblaciones.

Durante el invierno (en general, fuera del periodo reproductor) forma dormideros, que pueden llegar a ser numerosos, en zonas con abundancia de comida. Se han localizado dormideros mixtos con cernícalo primilla, esmerejón, urraca, aguilucho pálido, aguilucho lagunero y búho campestre.

Es un depredador especializado en la captura de pequeños mamíferos, esencialmente pequeños roedores, que representan más del 85 % de su dieta, aunque también se alimenta, en menor proporción, de pequeñas aves, insectos y reptiles. Presenta un comportamiento oportunista, ya que aprovecha los cambios poblacionales de sus presas habituales. De éstas dependen, en gran medida, los movimientos que realiza, la adaptabilidad de su periodo de cría (que puede prolongarse durante la mayoría de los meses del año, realizando puestas sucesivas) y su éxito reproductor. Captura las presas generalmente mediante un vuelo cernido de exploración y con las patas colgando. Cuando localiza una presa desciende poco a poco, dejándose caer de forma repentina sobre ella. También caza al acecho desde posaderos. Se come la presa en lugares elevados, raramente en el suelo.

Empieza a ocupar sus territorios reproductores entre las últimas semanas de enero y las primeras de marzo. Construye su nido sobre árboles, siendo la encina el más frecuentemente utilizado en la Península Ibérica, pero puede ocupar cualquier especie de árbol con una ubicación y porte adecuados. Los árboles elegidos suelen encontrarse en bordes y lindes de parcelas. Ocasionalmente instala sus nidos sobre estructuras artificiales, como torretas de líneas eléctricas y pivotes de riego.

Las cópulas suelen llevarse a cabo sobre tres o cuatro posaderos en ramas secas próximas al nido. Construyen un nuevo nido cada año y entre puestas sucesivas, utilizando árboles diferentes, aunque se ha constatado la ocupación de algunos nidos durante varios años consecutivos.

El tamaño de puesta más frecuente es de 4 huevos, con un rango comprendido entre 2 y 6. Son frecuentes las puestas de reposición tras la pérdida de las primeras en fechas tempranas así como las segundas puestas en territorios con buena disponibilidad de presas. A veces el macho puede quedarse atendiendo a los pollos, ya crecidos, mientras la hembra realiza otra puesta emparejada con un macho diferente. Los pollos nacen tras un periodo de incubación comprendido entre 30 y 35 días, comienzan a realizar sus primeros vuelos transcurrido un tiempo idéntico al de la incubación y dependen de sus progenitores unos 40 días más, hasta que comienza el periodo dispersivo en busca de zonas con una alta abundancia de pequeños roedores. Una parte de la población juvenil permanece cerca del área donde nacieron hasta que comienza el siguiente periodo de cría.

Los territorios estudiados de esta rapaz rondan de media los 60 km², pero la mayor parte de su actividad la realizan en áreas centrales más reducidas, de unos 16 km². Pueden criar junto a otras especies, ocupando el mismo árbol o en las proximidades. Es relativamente frecuente que lo hagan junto al búho chico. Aunque comparten recursos tróficos, parece que no se disputan los lugares para nidificar, obteniendo con esta asociación protección mutua.

Dónde verla


Se distribuye de manera estable en el cuadrante suroccidental de la Península Ibérica. En Andalucía ocupa con densidades más elevadas las provincias más occidentales, siendo más escasa y con ocupa-



Rapaces diurnas de la provincia de Málaga

ciones más irregulares en las provincias orientales.

En Málaga esta especie ocupa principalmente las estepas cerealistas del norte de la provincia y los cultivos en mosaico del valle del Guadalhorce. Recientemente se ha observado durante el periodo reproductor por las campiñas cerealistas rondeñas, sin llegarse a confirmar su cría. Donde sí se ha confirmado la reproducción es en la campiña de Coín. Se observa con mayor frecuencia en el entorno de Fuente de Piedra y del complejo lacustre de Campillos, aunque fuera del periodo reproductor hay observaciones repartidas por casi toda la provincia.



Cuándo verla

Aunque suelen comportarse como aves residentes y ya hay una población establecida en la provincia, aún es reducida. Esto, unido a su carácter nómada, hace que algunos años haya más observaciones que otros, siendo más fácil observar a los elanios una vez finalizado el periodo de cría y durante la invernada.

Fenología

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Conservación

Las principales amenazas para la especie son la pérdida de hábitat, tanto por las políticas agrarias encaminadas a la intensificación agrícola, como por las políticas de desarrollo de energías renovables, con la ocupación masiva de terrenos de cultivo. Ambas producen una transformación que hace desaparecer zonas de reproducción y de ocupación durante la invernada y que afecta a la disponibilidad de presas y de lugares de nidificación. La electrocución es la principal causa de mortalidad no natural, ya que la



Elanio común

especie utiliza con mucha frecuencia los apoyos eléctricos.

Curiosidades

Es una especie que ha ocupado recientemente la Península Ibérica, llegando desde el norte de África. Las primeras citas para la especie se dieron en Portugal y Andalucía en la segunda mitad del siglo XIX. En la década de los años 70 empieza a establecerse como reproductora en España. En 2002 se confirma la primera reproducción de la especie en la provincia. Actualmente se discute si la reproducción fuera del suroeste ibérico se corresponde con una expansión natural de su área de distribución o con el aprovechamiento oportunista de explosiones demográficas de las especies que componen principalmente su dieta. Efectivamente, este proceso de expansión se ha ralentizado, ya que en la actualidad no se han establecido poblaciones importantes y estables en el tiempo fuera del núcleo principal de reproducción.

Especies similares

Puede llegar a confundirse con los cernícalos cuando no se aprecia la coloración del plumaje, pues tienen un tamaño parecido y utilizan las mismas técnicas de caza. En estos casos, las proporciones de la cabeza (más grande) y la cola (más corta) del elanio, así como detalles de su comportamiento, ayudan a su identificación. Una buena observación no deja lugar a dudas, por presentar un diseño único entre las rapaces ibéricas.



Elanio en vuelo (EAC)